

CALENDÁRIO VACINAL SBI_m 2023/2024

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																	ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIEs*		
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO					
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente										SIM	SIM	SIM							
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							CONTRAINDICADA																	SIM	SIM	NÃO
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa					
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM					
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses	SIM	SIM					
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC10, VPC13 ou VPC15, iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10, VPC13 ou VPC15 – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco			VPC13 ou VPC15: uma dose	SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13						
Meningocócicas conjugadas	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO		Reforço aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de cinco anos		Vacinar pessoas em situações especiais de risco			SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 12 anos	SIM	SIM, menC e menACWY					
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada					Vacinar pessoas em situações especiais de risco			NÃO	SIM	NÃO				
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																	SIM	NÃO	NÃO							
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																	SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente							
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBI_m: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBI _m recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																	SIM	SIM	NÃO							
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 59 anos	SIM	NÃO						
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM	SIM	SIM						
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM						
HPV	Duas doses para meninas e meninos											Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar não vacinados e pessoas em situações especiais de risco, a critério médico (três doses)			SIM, HPV4 duas doses para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV4 e HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais								
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																	Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM					
Herpes zóster	A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																	Rotina a partir dos 50 anos		NÃO	SIM	NÃO					
Dengue	CONTRAINDICADA																	Qdenga recomendada entre 4 e 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue, duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue, três doses com intervalo de seis meses entre elas.		CONTRAINDICADA			NÃO	SIM	NÃO		
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19																										

03/08/2023 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBI_m 2021/2022* e nos *Calendários de vacinação SBI_m pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_imunobiologicos_especiais_5ed.pdf (acesso em 01.09.2022). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBI_m pacientes especiais*.

- Rotina
- Vacinar não vacinados
- Situações especiais
- Contraindicada



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBI_m